

Aciclovir Actavis 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Læs denne indlægseddell grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægseddelen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Aciclovir Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give Aciclovir Actavis til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægseddelen

1. Virkningen af Aciclovir Actavis og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir Actavis
3. Sådan skal du tage Aciclovir Actavis
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Aciclovir Actavis
6. Yderligere oplysninger

1. Virkningen af Aciclovir Actavis og hvad du skal bruge det til

Aciclovir Actavis er et middel mod infektioner med herpesvirus. Aciclovir Actavis virker ved at hæmme dannelsen af virus.

Du kan tage Aciclovir Actavis til

- behandling af herpes på hud og slimhinder
- behandling af helvedesild (Herpes zoster)
- at forebygge herpes på hud og slimhinder, hvis du har dårligt immunforsvar
- behandling af skoldkopper. Lægen kan have givet dig Aciclovir Actavis til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir Actavis

Tag ikke Aciclovir Actavis

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for valaciclovir (andet middel mod herpes).

Vær ekstra forsigtig med at tage Aciclovir Actavis

Tal med lægen inden du tager Aciclovir Actavis

- hvis du har nedsat nyrefunktion.

Vær opmærksom på følgende

- hvis du får høje doser, skal du sørge for at drikke rigelig med væske under behandlingen
- hvis du tager Aciclovir Actavis mod helvedesild, skal du starte behandlingen hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Aciclovir Actavis. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du bruger medicin mod

- urinsyreigt (probenecid)
- for meget mavesyre (cimetidin).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Aciclovir Actavis, og Aciclovir Actavis kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Aciclovir Actavis sammen med mad og drikke

Du kan tage Aciclovir Actavis i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage Aciclovir Actavis under graviditet. Tal med din læge.

Amning

Aciclovir Actavis går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aciclovir Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Aciclovir Actavis

Tag altid Aciclovir Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Du skal tage Aciclovir Actavis tabletter med et glas vand.

Hvis du tager Aciclovir Actavis mod helvedesild, skal du starte behandlingen hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Herpes på hud og slimhinder

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen i 5 dage.

Helvedesild og skoldkopper

1 tablet på 800 mg 5 gange om dagen i 7 dage.

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende herpesudbrud

Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning.

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis du har nedsat immunforsvar

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen.

Ældre

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisninger.

Børn

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud

2 – 14 år: Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Tal med lægen.

Under 2 år: Enten 1 tablet på 200 mg 2 gange om dagen eller ½ tablet på 200 mg (i alt 100 mg) 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Tal med lægen.

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis barnet har nedsat immunforsvar

2 – 14 år: 1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen.

Under 2 år: ½ tablet på 200 mg 5 gange om dagen.

Skoldkopper

Over 6 år: 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen i 5 dage.
2 – 6 år: 1 tablet på 400 mg 4 gange om dagen i 5 dage.
Under 2 år: 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen i 5 dage.

Børn skal normalt ikke have mere end 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen i 5 dage. Tal med lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Aciclovir Actavis tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, hovedpine og forvirring.

Hvis du har glemt at tage Aciclovir Actavis

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Aciclovir Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Det kan være livsfarligt, ring 112.
- Hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre at luftvejene blokeres. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
- Krampe. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blodning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
- Nyresvigt med kvalme opkastninger og evt. aftagende urinproduktion. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Forvirring, uro, påvirket bevidsthed, evt. besvimelse, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Søvnliggende bevidsthedssvækkelse. Kontakt læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 behandlede):

- Hovedpine, svimmelhed.
- Kvalme, opkastning, diaré, mavesmerter.
- Kløe, udslæt, øget følsomhed af huden for lys.
- Træthed, feber.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):

- Nældefeber, hårtab.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

- Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Almen sløvhed, træthed, tendens til betændelse (infektioner) især Halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer og blodmangel). Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Psykiske forstyrrelser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Aciclovir Actavis kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. påvirkning af leveren og nyrerne.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde være andre ikke alvorlige bivirkninger. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker oplysninger om disse bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan opbevarer du Aciclovir Actavis

- Opbevar Aciclovir Actavis utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Aciclovir Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Aciclovir Actavis 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Aciclovir.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose; natriumstivelsesglycolat; povidon, magnesiumstearat og kolloid vandfri silica,

Udseende af Aciclovir Actavis og pakningsstørrelser

Udseende

Aciclovir Actavis 200 mg er en hvid, rund tablet uden delekærv og mærket "AIR 200".

Aciclovir Actavis 400 mg er en hvid, aflang tablet med delekærv og mærket "AIR 400".

Aciclovir Actavis 800 mg er en hvid, aflang tablet med delekærv og mærket "AIR 800".

Pakningsstørrelser

200 mg: 25 tabletter.

400 mg: 56 tabletter.

800 mg: 35 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group hf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island.

Fremstillere

Synthon Hispania S.L.
C/ Castelló 1, 1. Pol. Las Salinas
08830 San Boi de Llobregat
(Barcelona)
Spanien

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i maj 2011